



ประกาศกำหนดเขตโรคระบาด
ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease) ในโคนม โคนเนื้อ กระบือ
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘

.....
เนื่องด้วยจังหวัดสุรินทร์ พบการรายงานการเกิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease) ในโคนม โคนเนื้อ กระบือ อย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์ และมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายไปในวงกว้างซึ่งพาหะหลักคือแมลงดูดเลือด ยุง เ็บ เหลือบและแมลงวัน เพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จึงจำเป็นต้องดำเนินการควบคุม แก้ปัญหาการแพร่ระบาดให้สงบลงอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันการเกิดและแพร่กระจายโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease)

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กำหนดให้ท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ในจังหวัดสุรินทร์ เป็นเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease) ชนิดสัตว์ควบคุม โคนม โคนเนื้อ กระบือ

ข้อ ๒ เมื่อได้มีการกำหนดเขตโรคระบาดขึ้นแล้ว เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ ๑๔ ๑๖ ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยสังเขป คือ

ข้อ ๒.๑ ให้เจ้าของสัตว์แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ ภายใน ๑๒ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ทราบว่ามีสัตว์ป่วยหรือตาย เมื่อมีสัตว์ป่วยหรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาด มีสัตว์ป่วยหรือตายโดยไม่รู้สาเหตุ และในหมู่บ้านเดียวกัน หรือบริเวณใกล้เคียงกัน มีสัตว์ป่วยหรือตายมีอาการคล้ายคลึงกันในระยะเวลาห่างกันไม่เกินเจ็ดวัน

ข้อ ๒.๒ กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าป่วย หรือย้ายสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูงหรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยหรือตายไว้ในเขตตามวิธีที่กำหนด

ข้อ ๒.๓ ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายโคนม โคนเนื้อและกระบือ หรือซากสัตว์ดังกล่าวเข้า-ออก หรือผ่านในเขตนั้นเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้น ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย

เจ้าของสัตว์ ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสัตวแพทย์ทุกประการ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติหรือคำสั่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบรรณ ทรประสิทธิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

เฝ้าระวัง!!

“โรคล้มปี-สกิน”


Lumpy skin disease : LSD

โรคระบาดในโค-กระบือ ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ 2558

เกิดจากเชื้อ ไวรัส (Capripoxvirus) ระบาดในโค-กระบือ ผ่านแมลงดูดเลือด ไม่ติดมนุษย์



- ✓ ตุ่มนูนแข็ง ขึ้นตามลำตัว
- ✓ ต่อมน้ำเหลืองโต
- ✓ อาจมีไข้สูง ซึม
- ✓ อาจพบตาหรือข้อขาบวมอักเสบ
- ✓ ในโคนมนมอาจลด



ตุ่มนูนบริเวณลำตัว



ต่อมน้ำเหลืองโต



แมลงดูดเลือดบริเวณจุดรอยปาก



มีไข้ ซึม เบื่ออาหาร อาจมีน้ำลาย น้ำตาไหล

- ๘ อัตราการป่วย 5-45 %
- ๘ อัตราการตายน้อยกว่า 10%
- อัตราการตายสูงขึ้นในโคอายุน้อย

ติดต่อผ่านแมลงดูดเลือด



พาหะหลักคือแมลงดูดเลือด ยุง เ็บ เหลือบ แมลงวัน

น้ำลาย สารคัดหลั่งต่างๆ สะเก็ดแผล สามารถเป็นตัวแพร่เชื้อได้ แต่ไม่ใช่ทางติดต่อหลัก

หากพบในฟาร์มควรทำอะไร

1. แยกสัตว์แสดงอาการออก เพื่อรักษาและป้องกันการระบาดเพิ่ม
2. กำจัดพาหะแมลงดูดเลือดโดยใช้ สารกำจัดแมลงละลายน้ำ พ่นบริเวณตัวสัตว์และบริเวณคอกในฟาร์ม เช่น อะมิทราซ(Amitraz) ไซเปอร์เมทริน หรือเดลตามาทริน เป็นต้น ทุกๆ 7-14 วัน
3. เฝ้าระวังติดตามอาการในสัตว์ที่ไม่แสดงอาการ พบเร็วรักษาหายไว



ตัวอย่างสารกำจัดแมลง (ไม่ตกค้างในน้ำนม)

ฟาร์มโคนมที่เกิดโรค อาจไม่จำเป็นต้องหยุดส่งนม ควรปฏิบัติตามมาตรการของแต่ละพื้นที่

งดนำเข้าโคจากพื้นที่เสี่ยง!!

แนวทางการรักษาเบื้องต้น

1. ยาากลุ่มลดไข้ ลดอักเสบ ลดบวม เช่น Flunixin meglumine, Tolfenamic acid, หรือ Dexamethasone(ในโคไม่ต้อง) เป็นต้น
2. ยาปฏิชีวนะ เช่น Oxytetracycline, Penicillin, Cephalosporins
3. ยาากลุ่มอื่นๆ เช่น ยาบำรุง ยาถ่ายพยาธิ หรือให้สารน้ำ เป็นต้น

ทั้งนี้ การรักษาขึ้นกับระดับอาการที่พบ แล้วแต่กรณี และควรปรึกษาสัตวแพทย์

“หากพบให้รีบแจ้ง
ปศุสัตว์ในพื้นที่
เพื่อควบคุมการระบาด!!!”

หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4